

NO ESTÁS solo



1 Una mirada más de cerca a la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)

La incidencia y prevalencia en EII ha aumentado en los últimos 50 años.

La prevalencia global de EII en 2015




Alta Intermedia Baja Sin información Fuente: Molodecky et al. (adaptado)

Cada año aproximadamente 10 de cada 100.000 personas se diagnostican con Colitis Ulcerosa y 16 de cada 100.000 con Enfermedad de Chron.

2 ¿Qué es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)?

La EII es un término general que se utiliza para describir trastornos que involucran inflamación crónica del tracto digestivo.



Los tipos mejor conocidos de EII incluyen:

COLITIS ULCEROSA

Esta afección implica inflamación y lesión (úlceras) a lo largo del revestimiento superficial o mucosa del intestino grueso (colon) y el recto exclusivamente. Los síntomas predominantes son diarrea, urgencia y sangrado rectal.

ENFERMEDAD DE CROHN

Este tipo de EII se caracteriza por la inflamación del revestimiento en cualquier sector del tracto digestivo, que a menudo puede afectar las capas más profundas del mismo. Pueden existir síntomas como diarrea, dolor abdominal, fatiga y pérdida de peso.

3 ¿Cuál es la causa de EII?

La EII es una patología de etiología multifactorial y compleja, con aspectos conocidos y otros en investigación. Si bien tanto la Enfermedad de Crohn (EC) como la Colitis Ulcerosa (CU) han sido consideradas idiopáticas, se han identificado factores genéticos y ambientales que predisponen a estas enfermedades.

Alteraciones en el sistema inmune



Predisposición genética



Factores luminales microbioma intestinal



Factores ambientales



No es una enfermedad hereditaria


pero aparece en personas con predisposición genética, en las que la interacción con distintos factores ambientales (gérmenes, dieta, contaminantes, etc.) desencadena una respuesta inmunológica anómala que se mantiene en el tiempo.

Diversos factores ambientales se han vinculado con el desarrollo de la EII

pero ninguno se ha confirmado como causal. Se cree que son los antígenos (sustancias que dan lugar a la respuesta inmunitaria), que se encuentran en la luz intestinal, los que generan la inflamación en el intestino.

4 ¿Puede afectar a otras partes del cuerpo?

En algunos pacientes pueden estar afectados otros órganos diferentes al tubo digestivo.



Ojos

Uveitis

Articulaciones y Columna vertebral

Artritis y espondilitis anquilosante

Hígado

Colangitis esclerosante primaria

Piel

Pioderma gangrenoso

Algunos de estos problemas suelen mejorar cuando la inflamación está controlada, aunque a veces requieren medicación específica.

5 ¿Cómo es el tratamiento de la EII?

La EII es una enfermedad crónica y hasta la fecha no hay ningún tratamiento que sea curativo. Sin embargo, se dispone de una amplia variedad de fármacos que permiten tener un adecuado control de los síntomas que mejoran la calidad de vida de los pacientes.

El tratamiento de la EII es complejo y muy variable de un paciente a otro por lo que requiere un enfoque personalizado. Los síntomas que presenta el paciente y los resultados de los estudios solicitados son los que sirven de guía a la hora de prescribir un tratamiento u otro.

A lo largo del curso evolutivo de la EII aparecen episodios de actividad inflamatoria, denominados "brotos", y períodos en los que el paciente está asintomático, lo que se conoce como "remisión clínica".

Existen tratamientos para cada una de estas etapas, es decir, los que se utilizan para controlar la clínica en los brotes de actividad, controlando los síntomas y evitando complicaciones, y, por otro lado, aquellos tratamientos de mantenimiento para mantener la enfermedad inactiva y evitar la reaparición de síntomas.



6 ¿Cuál es el objetivo del tratamiento?

El objetivo del tratamiento es la desaparición de los síntomas y la restauración de la calidad de vida de los pacientes mediante la cicatrización de las lesiones que producen inflamación intestinal, para evitar así la progresión de la enfermedad y sus posibles complicaciones.

La buena adherencia es MUY IMPORTANTE.



El tratamiento de la EII es crónico y no debe suspenderse sin la indicación médica, ya que interrumpirlo puede acelerar una recaída y afecta la aparición de complicaciones.

El objetivo es mantenerse asintomático.

FERRING TE (VIDA)

PROGRAMA DE SOPORTE AL PACIENTE

0800-444-6385

Este material está destinado exclusivamente para uso de los pacientes. La información para prescribir productos está disponible en la Dirección Médica de Laboratorios Ferring S.A. (Av. Del Libertador 350, piso 6, B1638BEP, Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Tel. +54 11 4 585 8900). Ante la eventualidad de un evento adverso que involucre un producto de Laboratorios Ferring S.A. por favor tenga a bien reportarlo a: farmacovigilancia.argentina@ferring.com.

AR-COR-2300002

